



**FUZARIJ**, okužbe iz rodu gliv *Fusarium* spp.  
*Fusarium* spp.

**Čas okužbe:** začetek zorenja

**Možnost okužbe, moč okužbe:** 20–40 %

**Prepoznavna:** belo do rdečkasto obarvani vrhovi storžev

**Varstvo:** kolobar, uporaba fungicidov v prejšnjih kulturah (pšenica)



**KORUZNA RJA**  
*Puccinia sorghi*

**Čas okužbe:** julij–september

**Možnost okužbe, moč okužbe:** 20–40 %

**Prepoznavna:** rjavi kupčki Uredo spor na listih

**Vir okužb:** spore se prenašajo po zraku v času žetve, preživijo v tleh

**Varstvo:** kolobar, dobra kmetijska praksa



**KORUZNA BULAVA SNET**  
*Ustilago maydis*

**Čas okužbe:** do konca cvetenja

**Možnost okužbe, moč okužbe:** 5–50 %

**Prepoznavna:** bule na storžih, tudi na steblih in metlicah

**Vir okužb:** prenos spor po zraku v času žetve, spore preživijo v neobdelanih tleh do 6let

**Varstvo:** kolobar, obdelava tal v jeseni



**KORENINSKA GNILOBA KORUZE**  
*Rhizoctonia microsclerotia*

**Čas okužbe:** začetek rastle dobe

**Možnost okužbe, moč okužbe:** 20–60 %

**Prepoznavna:** proge na koreninskem vratu in lom stebel pri tleh

**Vir okužb:** spore se prenašajo po zraku v času žetve

**Varstvo:** dobra kmetijska praksa